Fimlab

Päivitetty 4.1.2016

VUOTOKYSELYLOMAKE

(Potilas tai hoitava lääkäri täyttää)

Tyhjennä | Tulosta

POTILASTIEDOT

Pvm

Nimi*

Henkilötunnus/syntymäaika*

Onko sinulla vuoto-oireita, jotka häiritsevät normaalielämää tai ovat vaatineet lääkärin arviota? ◯ Kyllä ◯ Ei

Minkä ikäisenä vuoto-oireita on esiintynyt? (esim. lapsena, aina, viime vuosina)

Onko sinulla koskaan todettu anemiaa? ◯ Kyllä ◯ Ei
Syy ja hoito:

Onko koskaan todettu vuotosairautta? ◯ Kyllä ◯ Ei
Diagnoosi:

Onko suvussa vuototaipumusta? ◯ Kyllä ◯ Ei
Tarkemmat tiedot:

Käyttämäsi lääkkeet ja luontaistuotteet edeltävien 30 vrk ajalta (nimi ja annos):

Vuoto-oireet – onko sinulla ollut koskaan seuraavia vuoto-oireita?

Nenäverenvuoto ◯ Kyllä ◯ Ei

Milloin sinulla on ollut nenäverenvuotoja? (esim. lapsesta asti, vain lapsuudessa, viime vuosina)

Vuotokertoja vuodessa? ◯ < 1 ◯ 1-5 ◯ 5-15 ◯ > 15

Vuodon kesto yleensä? ◯ < 1 min ◯ 1-10 min ◯ > 10 min

Lääkärissäkäynti nenäverenvuodon vuoksi? ◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Polttohoito / tamponointi

◯ Antifibrinolyyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)

◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Mustelmataipumus ◯ Kyllä ◯ Ei

Milloin sinulla on ollut mustelmia? (esim. lapsesta asti, vain lapsuudessa, viime vuosina)

Mustelmien koko tavallisimmin: ◯ < 1 cm ◯ > 1 cm ◯ laaja (yli kämmenen kokoinen)

Mustelmien (yli 1 cm) määrä kerralla: ◯ ≤ 5 ◯ > 5

Mustelmia ilman vammaa tai vähäisestä vammasta: ◯ Kyllä ◯ Ei

Lääkärissäkäynti mustelmataipumuksen vuoksi ◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Pienten haavojen pitkittynyt vuoto

◯ Kyllä ◯ Ei

Vuotokertoja vuodessa: ◯ < 1 ◯ 1-5 ◯ 5-15 ◯ > 15

Vuodon kesto yleensä: ◯ < 10 min ◯ > 10 min

Lääkärissäkäynti pienten haavojen vuodon vuoksi: ◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Kirurginen vuodontyrehdytys

◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Suuontelon vuoto

◯ Kyllä ◯ Ei

Vuodon tyyppi:

◯ Vuoto hampaan puhkeamisen yhteydessä

◯ Spontaani (itsestään alkanut) ienvuoto

◯ Ienvuoto hampaiden harjauksen jälkeen

◯ Vuoto huuleen tai kieleen puremisen jälkeen

Vuodon kesto keskimäärin: ◯ < 10 min ◯ > 10 min

Lääkärissäkäynti suuontelon vuotojen vuoksi: ◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Kirurginen vuodontyrehdytys

◯ Antifibrinolyyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)

◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Vuoto hampaanpoiston jälkeen

Onko tehty hampaanpoistoja? ◯ Kyllä, lukumäärä: ☐ ◯ Ei

Monessako hampaanpoistossa on ollut poikkeavaa vuotoa (myös vuosiluvut, jos tiedossa)

Lääkärissäkäynti hampaanpoistoon liittyvän jälkivuodon vuoksi: ◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Uudelleen ompelu tai tamponointi

◯ Antifibrinolyyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)

◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Leikkausvuoto

Onko tehty leikkauksia? ◯ Kyllä, lukumäärä: ☐ ◯ Ei

Mihin leikkauksiin on liittynyt poikkeavaa vuotoa (myös vuosiluvut, jos tiedossa)?

Mihin leikkauksiin ei ole liittynyt poikkeavaa vuotoa (myös vuosiluvut, jos tiedossa)?

Toimenpiteet leikkaukseen liittyneen vuodon vuoksi:

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Kirurginen vuodontyrehdytys

◯ Antifibrinolyyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)

◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Verivirtsaisuus ◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Spontaani (itsestään alkanut) vuoto

◯ Muuhun sairauteen (virtsatietulehdus, virtsatiekivet, munuaisten tai virtsarakon sairaus) liittyvä vuoto

Vuotokertoja vuodessa: ◯ < 1 ◯ 1-5 ◯ 5-15 ◯ > 15

Näkyvää verta virtsassa: ◯ Kyllä ◯ Ei

Lääkärissäkäynti spontaanin verivirtsaisuuden vuoksi: ◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Kirurginen hoito

◯ Rautalääkitys

◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Maha-suolikanavan vuoto (mahalaukku, suolisto)

◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Spontaani (itsestään alkanut) vuoto

◯ Muuhun sairauteen (mahahaava, porttilaskimon kohonnut paine, peräpukamat, angiodysplasia) liittyvä vuoto

Vuotokertoja vuodessa:

◯ < 1 ◯ 1-5 ◯ 5-15 ◯ > 15

Lääkärissäkäynti spontaanin maha-suolikanavan vuodon vuoksi:

◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Kirurginen hoito

◯ Antifibrinolyyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)

◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

Lihasverenvuoto

◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Vamman jälkeen

◯ Ilman vammaa (spontaanisti)

Lääkärissäkäynti lihasverenvuodon vuoksi:

◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Kirurginen hoito

◯ DDAVP (Octostim) tai hyytymistekijäkorvaushoito

◯ Verensiirto

Nivelverenvuoto

◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Vamman jälkeen

◯ Ilman vammaa (spontaanisti)

Lääkärissäkäynti nivelverenvuodon vuoksi:

◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Kirurginen hoito

◯ DDAVP (Octostim) tai hyytymistekijäkorvaushoito

◯ Verensiirto

Keskushermostovuoto

◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Vamman jälkeen

◯ Ilman vammaa (spontaanisti)

Vuodon tyyppi:

◯ Aivoverenvuoto (intraserebraalivuoto, ICH)

◯ Subaraknoidaalivuoto (lukinkalvonalainen vuoto, SAV)

◯ Subduraalivuoto (kovakalvonalainen vuoto, SDH, SDV)

◯ Epiduraalivuoto (kovakalvon ja kallon luun välinen vuoto)

Muu poikkeava vuoto-oire

◯ Kyllä ◯ Ei

Mikä/mitkä (myös vuosiluvut, jos tiedossa)?
(esim. napatyngän verenvuoto, silmänsisäinen vuoto, rintaontelon vuoto, pitkittynyt vuoto verinäytteen oton yhteydessä tai rokotuksiin liittyen, ovulaatiovuoto)

Lääkärissäkäynti muun poikkeavan vuoto-oireen vuoksi:

◯ Kyllä ◯ Ei

◯ Pelkkä lääkärintarkastus

◯ Kirurginen vuodontyrehdytys

◯ Antifibrinolyyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)

◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito

NAISILLE

Käytätkö tällä hetkellä jotain ehkäisyvalmistetta? ◯ Kyllä, valmiste: _____ ◯ Ei

Oletko raskaana? ◯ Kyllä, raskausviikko: _____ ◯ Ei

Runsaat kuukautiset: ◯ Kyllä ◯ Ei

Milloin kuukautiset ovat olleet runsaat? (esim. murrosiässä, aina, viime vuosina, ennen vaihdevuosia)

Onko runsaalle vuodolle muuta mahdollista selitystä? ◯ Kyllä, mikä: _____ ◯ Ei

Kuukautisvuodon kesto keskimäärin päivissä: _____

Kuinka usein kuukautissuoja pitää vaihtaa runsaimpina vuotopäivinä (tunteina)? _____

Hyytymiä kuukautisvuodossa: ◯ Kyllä ◯ Ei

Poissaolo koulusta/töistä runsaan vuodon vuoksi: ◯ 0–2 ◯ > 2 kertaa vuodessa

Lääkärissäkäynti runsaiden kuukautisten vuoksi ◯ Kyllä ◯ Ei

- ◯ Pelkkä lääkärintarkastus
- ◯ Ehkäisyvalmiste
- ◯ Antifibrinolyyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)
- ◯ Rautalääkitys
- ◯ Kaavinta, kohdunpoisto tai muu kirurginen toimenpide
- ◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito
- ◯ Sairaalahoito runsaiden kuukautisten vuoksi

Synnytysvuoto ja synnytyksen jälkivuoto

Onko ollut synnytyksiä? ◯ Kyllä, lukumäärä: _____ ◯ Ei

Kuinka monessa synnytyksessä on ollut poikkeavaa vuotoa? _____

Kuinka moneen synnytykseen on liittynyt poikkeavaa jälkivuotoa? _____

Jälkivuodon kesto viikoissa: _____

Lääkärissäkäynti jälkivuodon vuoksi: ◯ Kyllä ◯ Ei

Synnytysvuodon / jälkivuodon hoito:

- ◯ Pelkkä lääkärintarkastus
- ◯ Antifibrinolyyttinen lääke (Cyklokapron, Caprilon)
- ◯ Rautalääkitys
- ◯ Kaavinta
- ◯ DDAVP (Octostim), verensiirto tai hyytymistekijäkorvaushoito
- ◯ Kohdunpoisto / kohtuvaltimon embolisaatio