

## Patientuppgifter

Datum

Namn\*

Personbeteckning/födelsedatum\*

Har du blödningssymptom som har en inverkan  
på vardagen eller som krävt läkarbesök? Ja Nej

I vilken ålder har du haft blödningssymptom? (t.ex. som barn, alltid, under de senaste åren)

Har du någonsin fått diagnosen anemi?  
Orsak och behandling: Ja NejHar du någonsin fått diagnosen blödningssjukdom?  
Diagnos: Ja NejFinns det blödningsbenägenhet i släkten?  
Ifall svaret är ja, förklara närmare: Ja Nej

Ange läkemedel samt naturläkemedel som du har använt under de senaste 30 dagarna (namn och dos):

**Blödningssymptom – har du någonsin haft följande blödningssymptom?****Näsblod** Ja  Nej

När har du haft näsblod? (t.ex. som barn, alltid, under de senaste åren)

Hur många gånger per år?

 < 1  1-5  5-15  > 15

Hur länge varar blödningen vanligen?

 < 1 min  1-10 min  > 10 min

Har du besökt läkare pga näsblod?

 Ja  Nej  
 Endast läkarkontroll  
 Bränning eller tamponering  
 Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon)  
 DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling**Anlag för blåmärken** Ja  Nej

När har du haft blåmärken? (t.ex. som barn, alltid, under de senaste åren)

Blåmärkenas storlek vanligen:

 < 1 cm  > 1 cm  omfattande (större än handflatan)

Mängd blåmärken (större än 1 cm) per gång:

 ≤ 5  > 5

Blåmärken utan skada eller efter minimal skada:

 Ja  Nej

Har du besökt läkare pga anlag för blåmärken?

 Ja  Nej  
 Endast läkarkontroll  
 DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling

**Små sår blöder rikligt** Ja  Nej

Hur många gånger per år?

 < 1  1-5  5-15  > 15

Hur länge varar blödningen vanligen?

 < 10 min  > 10 min

Har du besökt läkare pga blödning från små sår?

 Ja  Nej Endast läkarkontroll Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling**Blödningar i munhålan** Ja  Nej

Blödningstyp:

 Blödning i samband med tandsprickning Spontan blödning i tandköttet (som börjar av sig själv) Tandköttet blöder efter tandborstning Blödning efter att du har bitit dig i läppen eller tungan

Hur länge varar blödningen vanligen?

 < 10 min  > 10 min

Har du besökt läkare pga blödningar i munhålan?

 Ja  Nej Endast läkarkontroll Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling**Blödning efter tandutdragning**

Har du fått tänder utdragna?

 Ja, antal:   Nej

I samband med hur många tandutdragningar har det förekommit avvikande blödning (om möjligt, ange också årtal):

Har du besökt läkare pga avvikande blödning efter tandutdragning?

 Ja  Nej Endast läkarkontroll Nya stygn eller tamponering Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling

**Blödning under eller efter operationer**

Har du genomgått operationer?

 Ja, antal:   NejI vilka operationer har det förekommit avvikande blödning? Vilka operationer (om möjligt ange också årtal)?I vilka operationer har det inte förekommit avvikande blödning (om möjligt ange också årtal)?

Åtgärder på grund av avvikande blödning i samband med operation:

- Endast läkarkontroll
- Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet
- Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon)
- DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling

**Blod i urinen** Ja  Nej

- Spontan blödning (som börjar av sig själv)
- Blödning i samband med annan sjukdom (urinvägsinfektion, urinvägsstenar, sjukdom i njurarna eller i urinblåsan)

Hur många gånger per år?

 < 1  1-5  5-15  > 15

Synligt blod i urinen:

 Ja  Nej

Har du besökt läkare pga spontan blödning i mag-tarmkanalen?

 Ja  Nej

- Endast läkarkontroll
- Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet
- Järnbehandling
- DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling

**Blödningar i mag-tarmkanalen (magsäcken, tarmen)** Ja  Nej Spontan blödning (som börjar av sig själv) Blödning i samband med annan sjukdom (magsår, förhöjt blodtryck i portasystemet, hemorrojder, angiodysplasi)

Hur många gånger per år?

 < 1  1-5  5-15  > 15

Har du besökt läkare pga spontan blödning i mag-tarmkanalen?

 Ja  Nej Endast läkarkontroll Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon) DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling**Blödningar i musklerna** Ja  Nej Efter skada Utan skada (spontan blödning)

Har du besökt läkare pga blödningar i lederna?

 Ja  Nej Endast läkarkontroll Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet DDAVP (Octostim) eller substitutionsbehandling Blodtransfusion**Blödningar i lederna** Ja  Nej Efter skada Utan skada (spontan blödning)

Har du besökt läkare pga blödningar i lederna?

 Ja  Nej Endast läkarkontroll Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet DDAVP (Octostim) eller substitutionsbehandling Blodtransfusion

**Blödningar i centrala nervsystemet**

- Ja       Nej
- Efter skada
- Utan skada (spontan blödning)

Blödningstyp:

- Hjärnblödning (intracerebral blödning, ICH)
- Subarachnoidal blödning (SAH)
- Subdural blödning (SDH)
- Epidural blödning

**Andra avvikande blödningssymptom**

- Ja       Nej

Vilket/vilka (om möjligt, ange också årtal):

(t.ex. blödning i navelsträngens stump, blödning in i ögat, blödning i brösthålan, förlängd blödning i samband med blodprovstagnning eller vaccination, ovulationsblödning)

Har du besökt läkare pga andra avvikande blödningssymptom?  Ja       Nej

- Endast läkarkontroll
- Kirurgiska åtgärder att stoppa blodflödet
- Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon)
- DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling

## FÖR KVINNOR

Använder du för tillfället något preventivpreparat (p-piller eller dylik)?

Ja, preparat:   Nej

Är du gravid?

Ja, graviditetsvecka:   Nej

**Rikliga menstruationer**

Ja  Nej

När har menstruationerna varit rikliga? (t.ex. i tonåldern, alltid, under de senaste åren, före klimakteriet)

Finns det någon annan möjlig orsak till det rikliga blodflödet?

Ja, vilken:   Nej

Hur länge varar menstruationsflödet i genomsnitt, i dagar?

Hur ofta måste mensskydd bytas under dagarna med riklig mens (ange timintervall)?

Koagel (levrat blod) i menstruationsflödet:

Ja  Nej

Frånvaro från skolan/jobbet på grund av rikliga menstruationer:

0-2  > 2 gånger per år

Har du besökt läkare pga rikliga menstruationer:

Ja  Nej

Endast läkarkontroll

Preventivpreparat (t.ex. p-piller)

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon)

Järnbehandling

Skrapning, uterektomi eller annan kirurgisk åtgärd

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling

Sjukhusvård på grund av rikliga menstruationer

**Avvikande blödning under eller efter förlossning**

Har du genomgått förlossningar?

Ja, antal:   Nej

Vid hur många förlossningar har det förekommit avvikande blödning (under förlossningen)?

Vid hur många förlossningar har det förekommit avvikande avslag (blödning efter förlossningen)?

Hur länge har avslaget varat, i veckor:

Har du besökt läkare pga avvikande avslag?

Ja  Nej

Behandling av blödning under eller efter förlossning:

Endast läkarkontroll

Antifibrinolytisk läkemedel (Cyklokapron, Caprilon)

Järnbehandling

Skrapning

DDAVP (Octostim), blodtransfusion eller substitutionsbehandling

Uterektomi eller livmoderartärembolisering