CHLAMYDIA TRACHOMATIS JA NEISSERIA GONORRHOEAE, NUKLEIINIHAPPO (KVAL) VIRTSASTA

Näytteestä tutkitaan mahdollisia Chlamydia trachomatis ja Neisseria gonorrhoeae -infektioiden aiheuttajia. Huomioitavaa, että luotettavan näytteen saamiseksi tulee altistumisesta (suojaamattomasta seksistä) olla vähintään 5 vrk ennen näytteen ottoa.

Näytteenotto

Ota näyte, kun edellisestä virtsaamisesta on kulunut vähintään kaksi tuntia. Älä tee alapesua ennen näytteenottoa.

Näytteeksi otetaan n. 50 ml **alkuvirtsaa** puhtaaseen säilöntäaineettomaan näyteastiaan. Loppuvirtsan voit päästää wc-altaaseen.

Avaa näyteputken korkki. Näyteputkessa on valmiina liuosta, jota ei saa kaataa pois. Siirrä näytepakkauksen pipetillä virtsaa näyteputkeen, kunnes nestepinta on putkeen merkityn ikkunan puolessa välissä. Huom! Putkea ei saa täyttää liian täyteen. Sulje korkki huolellisesti. Kääntele putkea 5 kertaa ylösalaisin. Katso kuvallinen ohje näytepakkauksesta.

Toimita putki mahdollisimman pian laboratorioon tutkittavaksi. Näyte säilyy huoneenlämmössä.

Nimilappu on tärkeä näytteen tunnistamiseksi

Liimaa näyteputkeen tarra, johon kirjoitat:

- nimesi
- henkilötunnuksesi
- näytteenottopäivämäärän ja kellonajan

Lisätiedot

Tarkempia tietoja saat Fimlab Laboratoriot Oy:n asiakasneuvonnasta, puh. 010 808 515 arkisin ma-pe klo 7-16.